糖尿病発症におけるインクレチン効果の疫学的研究
(第2報) : 妊娠糖尿病のスクリーニングからのアプ
ローチ 平成24年度 神緑会研究事業年間報告書

田守, 義和
田中, 裕子
高橋, 哲也
岡田, 十三

(Citation)

神戸大学医学部神緑会学術誌, 29:7-10

(Issue Date)

2013-08

(Resource Type)

departmental bulletin paper

(Version)

Version of Record

(JaLCD0I)

<https://doi.org/10.24546/81006794>

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/81006794>

平成24年度 神緑会研究事業年間報告書

糖尿病発症におけるインクレチン効果の疫学的研究 (第2報) —妊娠糖尿病のスクリーニングからのアプローチ—

研究代表者	社会医療法人愛仁会	千船病院	代謝内分泌内科	田 守 義 和 (昭和63年卒)
研究協力者	社会医療法人愛仁会	千船病院	代謝内分泌内科	田 中 裕 子 (平成18年卒)
	社会医療法人愛仁会	千船病院	代謝内分泌内科	高 橋 哲 也 (平成元年卒)
	社会医療法人愛仁会	千船病院	産婦人科	岡 田 十 三 (平成6年卒)

概 要

2型糖尿病はインスリン抵抗性とインスリン分泌能によって規定される相対的なインスリン作用不足の結果発症する。インスリン抵抗性とインスリン分泌能はともに遺伝素因と環境素因に影響を受けるが、インスリン抵抗性を引き起こすもっとも代表的な環境素因は肥満である。しかし肥満は発症背景や程度が様々であるため、これに由来するインスリン抵抗性も極めて多様な病態を示し、2型糖尿病発症との関連を検討するのは容易ではない。一方、インスリン抵抗性の原因となる妊娠は対象が比較的若年の女性であり集団として均一性が高いことから、妊娠糖尿病 (GDM) は2型糖尿病の発症基盤を解析するうえで理想的なモデルとも言える。以上から、我々はGDMを対象として、2型糖尿病の耐糖能悪化に及ぼすインスリン抵抗性とインスリン分泌能の効果と特徴を検討した。同時にGDMの発症を効率よく予測する因子の検討を行った。さらに、GDMの診断に対する、インスリン抵抗性とインスリン分泌能の影響を調べた。最終的には、このモデルで、インスリン分泌を促進し、グルカゴン分泌を抑制するインクレチンであるGLP-1の効果を開明する。

研究方法

2011年11月から2012年4月まで、産婦人科と協力し、当院へ来院した全妊婦を対象に妊娠糖尿病 (GDM) のスクリーニング検査を行った。妊娠初期 (妊娠8-12週) または中期 (妊娠24-28週) に随時血糖を測定し、100mg/dl以上をスクリーニング陽性とした。スクリーニング陽性妊婦には栄養指導と診断検査 (75g経口ブドウ糖負荷試験: 75gOGTT) を施行した。75gOGTTに際し、血糖値0・30・60・120分、インスリン値 (IRI) 0・30分、Cペプチド濃度 (CPR) 0分、総GLP-1濃度0・30分、HbA1c、LDL-C、

HDL-C、中性脂肪、GOT、GPT、血清クレアチニン値を測定した。総GLP-1濃度測定に際しては、採血後のDPP-4による分解を最小限にするため、DPP-4阻害薬入りの真空採血管 (BD社) を使用した。GDMの診断は日本産婦人科学会診断基準に従い、①空腹時血糖92mg/dl以上、②1時間値180mg/dl以上、③2時間値153mg/dl以上のいずれか1つを満たしたものをGDMと診断した。ただし、①空腹時血糖126mg/dl以上、②HbA1c6.1% (JDS値) 以上、③随時血糖値200mg/dl以上、④確実な糖尿病網膜症の存在につき評価し、1項目でも満たした場合はovert diabetes in pregnancyとして除外した。

研究評価項目

年齢、検査時妊娠週数、家族歴、妊娠出産歴、非妊娠時BMI (Body Mass Index)、血圧、75gOGTTにおける前述の項目に加え、インスリン分泌能力の指標としてhomeostasis model assessment β (HOMA)- β ($\{ \text{空腹時血中インスリン濃度} (\mu\text{U/ml}) \times 360 \} / \{ \text{空腹時血糖} (\text{mg/dl}) - 63 \}$)、insulinogenic index (II) ($\Delta \text{血中インスリン濃度} (30 \text{分値} - 0 \text{分値}) (\mu\text{U/ml}) / \Delta \text{血糖値} (30 \text{分値} - 0 \text{分値}) (\text{mg/dl})$)、C-peptide reactivity (CPR) index ($\{ \text{空腹時血中Cペプチド濃度} (\text{ng/ml}) / \text{空腹時血糖} (\text{mg/dl}) \} \times 100$)、Oral Disposition Index (Oral DI) (II / 空腹時血糖 (mg/dl)) を、またインスリン抵抗性の指標としてhomeostasis model assessment ratio (HOMA-R) ($\text{空腹時血中インスリン濃度} (\mu\text{U/ml}) \times \text{空腹時血糖} (\text{mg/dl}) / 405$) および quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI) ($1 / \{ \log \text{空腹時血中インスリン濃度} (\mu\text{U/ml}) + \log \text{空腹時血糖} (\text{mg/dl}) \}$) を算出した。

現在までの結果

2011年11月～2012年4月に、GDMスクリーニング

検査を受けた548人の妊婦を対象にした。そのうちスクリーニング陽性（随時血糖値100mg/dl以上）で、随時血糖100～199mg/dlとなったのは110人であった。この患者に75gブドウ糖負荷試験を行った。その結果、overt diabetes in pregnancyは認めず、10人がGDMで100人が非GDMと診断された。このうち、上記の研究評価項目データをすべてを得られた、GDM群10名と非GDM群90名を対象に各種指標を比較検討した。血圧、GOT、GPT、血清クレアチニン値には有意差を認めなかった。年齢や非妊娠時のBMI、糖尿病家族歴、随時血糖値にも有意差を認めなかったが、空腹時血糖値（OGTT 0分値）はGDM群で有意に高値であった（78.0mg/dl and 91.3mg/dl, $p=0.003$ ）（表1）。またブドウ糖負荷後の血糖値もすべてGDM群で有意に高値であった。さらにHbA1c（JDS値）もGDM群で有意に高値であった（4.9% and 5.5%, $p<0.0001$ ）。脂質代謝指標については、中性脂肪値（TG）がGDM群で有意に高かった（191.5mg/dl and 269.4mg/dl, $p=0.0371$ ）（表2）。インスリン抵抗性の指標（HOMA-R, QUICKI）には有意差を認めなかったが、インスリン分泌能の指標のうち、インスリン抵抗性を考慮したインスリン分泌能の指標であるOral

DIのみがGDM群で有意な低下が認められた（0.16 and 0.07, $p<0.0001$ ）（表3）。その他の指標については有意差を認めなかった。

さらに上記結果のうち、GDM群と非GDM群で有意差のついたHbA1c, TG, Oral DIについて、どの指標がGDMの診断に有用性が高いかを検討するため、ROC（receiver operating characteristic）解析を行ったところ、HbA1c（JDS値）のAUC（area under curve）が0.924ともしっかりと高く、この3者の指標ではGDMを診断する上で、もっとも有益な指標であることが示唆された（図1）。また、この解析からもっとも効率よくGDMを予測するHbA1c（JDS値）のカットオフ値を算出すると5.1%であった。今回の検討では、10人のGDM患者のHbA1c値が5.1～5.8%に分布し、全員が5.1%以上であったことを考えても、GDM診断におけるHbA1cの意義は大きいものと推測される。

また、糖尿病家族歴の有無とBMIデータのみをGDM診断のベースモデルとして、診断の有用性をROC解析するとAUCは0.740であった（表4）。これ

表1 非GDMおよびGDM群の背景と75gOGTTの結果

	非GDM (n=90)		GDM (n=10)		p value
	mean	SD	mean	SD	
年齢	30.7	5.4	31.2	4.5	0.733
非妊娠時BMI	21.0	3.1	24.8	1.08	0.054
糖尿病家族歴 有 (%)	37.7		60.0		0.192
随時血糖 (mg/dl)	114.2	15.2	117.6	10.3	0.49
OGTT 0分値 (mg/dl)	78.0	5.2	91.3	10.5	0.003
OGTT 30分値 (mg/dl)	128.0	2.2	159.2	6.6	<0.0001
OGTT 60分値 (mg/dl)	131.2	2.9	185.2	8.7	0.0021
OGTT 120分値 (mg/dl)	108.4	16.4	156.7	28.6	0.0004
Glucose - AUC	236.5	31.6	319.7	55.9	0.001
HbA1c(JDS) (%)	4.9	0.03	5.5	0.10	<0.0001
CPR 0分値 (ng/ml)	1.18	0.43	1.76	0.29	0.078
Insulin 0分値 (μ U/ml)	6.36	0.37	10.6	1.12	0.11
Insulin 30分値 (μ U/ml)	154.8	60.2	114.4	56.0	0.20

表2 非GDMおよびGDM群の脂質プロファイル

	非GDM (n=90)		GDM (n=10)		p value
	mean	SD	mean	SD	
Total Cholesterol (mg/dl)	246.6	52.8	264.9	52.7	0.324
LDL-C (mg/dl)	84.5	16.4	80.9	21.5	0.533
HDL-C (mg/dl)	139.9	46.00	150.9	54.4	0.506
TG (mg/dl)	191.5	104.0	269.4	120.6	0.0371

表3 非GDMおよびGDM群のインスリン抵抗性とインスリン分泌能の指標

	非GDM (n=90)		GDM (n=10)		p value
	mean	SD	mean	SD	
CPR index	1.50	0.05	1.86	0.17	0.220
Insulinogenic Index (II)	0.85	0.05	0.80	1.08	0.894
HOMA-β	164.9	8.42	128.1	19.9	0.114
HOMA-R	1.24	0.59	2.51	2.00	0.076
QUICKI	0.38	0.029	0.35	0.047	0.11
Oral Disposition Index (DI)	0.16	0.083	0.07	0.045	<0.0001

図1 GDM診断に対する各種指標のROC解析

に随時血糖値, インスリン抵抗性を反映するHOMA-R, インスリン分泌能を反映するHOMA-βをそれぞれ追加してもROC解析におけるAUCは大きくは変わらなかったが, インスリン抵抗性を加味したインスリン分泌能を反映するOral DIを追加したモデルではAUCが最大となり(AUC=0.870), 診断的有用性をもっとも高まることが明らかとなった。

なお総GLP-1濃度については現在, 測定・検討中である。

考察と展望

妊娠は種々のインスリン拮抗ホルモンの影響でインスリン抵抗性が亢進する。妊娠母胎がインスリン抵抗性のためにある程度の異化亢進状態になることは、母

体から胎児に栄養を供給する上で合目的な状態であるが、 β 細胞のインスリン分泌能の予備能が低い妊婦では血糖上昇に繋がり、GDMを発症する。

GDMの診断は、まず随時血糖値で一次スクリーニングを行い、これが100mg/dlを越えたものを対象に75gOGTTを施行した。GDM群と非GDM群では随時血糖値に差は無かったが、空腹時およびブドウ糖負荷後の血糖値がGDM群で有意に高値であった。HbA1c値がGDMの診断に有用であるかどうかについては議論のあるところであるが、我々の検討ではROC解析でHbA1cのGDM診断に対するAUCが0.9以上と極めて高く、GDMと診断された妊婦では全員のHbA1c値が、最も効率よくGDMを予測するカットオフ値である5.1% (JDS値) 以上であったこと、

表4 家族歴の有無とBMIをbasic modelとしたROC解析によるGDM診断効率と各種指標を加味した効果

	AUC
Basic model	0.740
Basic model + 随時血糖	0.753
Basic model + HOMA-R	0.770
Basic model + HOMA-β	0.792
Basic model + Oral DI	0.870

さらに HbA1c は空腹時採血や負荷試験を行わずに随時採血で測定できることを考えると、HbA1c 値は GDM の診断に十分有用な検査指標となりうると考える。

予想に反して両群間でインスリン抵抗性指標 (HOMA-R, QUICKI) やインスリン分泌能指標 (HOMA- β) には有意差が無かったが、インスリン抵抗性を考慮に入れたインスリン分泌能の指標である Oral DI は GDM 群で有意に低く、GDM の診断にはインスリン抵抗性やインスリン分泌といった単独の指標では無く、両者の病態を複合的に反映する指標が重要であることを伺わせた。問診と身長・体重測定だけで得られる糖尿病家族歴の有無と BMI の結果をベー

スにした GDM の診断能は、インスリン抵抗性やインスリン分泌能の指標である HOMA-R や HOMA- β を単独で加えても大きな変化が無かったが、両者の概念を含んだ Oral DI を追加した場合に飛躍的に高まったことも、これを反映しているものと考えた。

現在までの我々の検討によって、GDM の診断には HbA1c が有用であることと、病態意義的にはインスリン抵抗性を加味したインスリン分泌能の低下が深く関与していることが明らかとなった。

今後は75gOGTT 時の血中総 GLP-1 を測定して、グルコース依存性にインスリン分泌を刺激するインクレチンが GDM の病態にどう関わっているか解明する予定である。