



Requirement of the F-actin-binding activity of l-afadin for enhancing the formation of adherens and tight junctions

Sakakibara, Shotaro

(Degree)

博士 (医学)

(Date of Degree)

2018-03-25

(Resource Type)

doctoral thesis

(Report Number)

甲第7158号

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/D1007158>

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。



(課程博士関係)

学位論文の内容要旨

Requirement of the F-actin-binding activity of I-afadin
for enhancing the formation of adherens and tight junctions

接着結合と密着結合の形成促進における I-アフアディンの
アクチン結合活性の必要性について

神戸大学大学院医学研究科医科学専攻
シグナル統合学・病態シグナル学
(指導教員：的崎 尚 教授)

榊原 正太郎

〔はじめに〕

極性を形成した上皮細胞は、隣り合う細胞が互いに接着して接着装置を形成し、シート状につながることで上皮シートを構築する。この細胞間接着装置としては主として密着結合と接着結合およびデスモソームの三つが知られている。このうち密着結合は、上皮シートにおける水溶性分子の拡散を制御するバリアとしての機能と、頭頂部と基底側面部における細胞形質膜領域の極性を形成するフェンスとしての機能を有している。接着結合は、隣り合う細胞を機械的に結合することにより、上皮シートの強度を維持すると共に上皮シートの変形を制御する機能を有している。さらに、接着結合は密着結合とデスモソームの形成と維持を制御する機能も有している。これらの細胞間接着装置は多くのアクチン結合タンパク質を介してアクチン細胞骨格によって裏打ちされており、このアクチン細胞骨格は細胞間接着装置の形成と維持および機能の制御に関与している。アフアディンはこのアクチン結合タンパク質の一つである。アフアディンには大きく分けて l-アフアディンと s-アフアディンの2つのバリエーションが存在する。l-アフアディンは、その N 末端より二つの RA ドメイン、一つの FHA ドメイン、一つの DIL ドメイン、一つの PDZ ドメイン、三つのプロリンリッチ領域、一つのアクチン結合ドメインを有している。s-アフアディンは C 末端領域の3番目のプロリンリッチ領域とアクチン結合ドメインを欠失している。l-アフアディンは全ての組織で発現するのに対し、s-アフアディンは脳のみで発現している。密着結合は細胞間接着分子であるクローディンとオクルーディンおよび JAM-1 がそれぞれ隣り合う細胞間で結合して形成される。また、アクチン結合タンパク質である ZO-1 と ZO-2 および ZO-3 がこれらの分子の細胞膜領域に結合している。接着結合は細胞間接着分子であるネクチンと E-カドヘリンがそれぞれ隣り合う細胞間で結合して形成される。また、l-アフアディンはネクチンの細胞質領域に、 β -カテニンと p120 カテニンは E-カドヘリンの細胞質領域に結合し、アクチン結合タンパク質である α E-カテニンがこの β -カテニンに結合している。これまでの解析から、上皮細胞が細胞間接着装置を形成する際、(1) まず隣り合う細胞間のネクチンが結合して細胞間を接着させる。(2) l-アフアディンはこのネクチンの細胞質領域に結合すると共に、 α E-カテニンとも結合し、ネクチンによって形成された接着部位に E-カドヘリンをリクルートして接着結合を形成する。(3) さらに、l-アフアディンは、ZO-1 と結合し、まず JAM-1 を、引き続いてクローディンとオクルーディンを接着結合の頭頂側にリクルートして密着結合を形成することが明らかになっている。しかし、この接着結合と密着結合の形成過程における l-アフアディンのアクチン結合活性の役割は不明であった。

〔結果〕

I. アフアディンノックアウト EpH4 細胞の樹立

従来、接着結合と密着結合の形成における l-アフアディンの役割は、shRNA により l-アフアディンをノックダウンした MDCK 細胞を用いて解析され、l-アフアディンをノックダウン

した MDCK 細胞では野性型の MDCK 細胞に比べ、接着結合と密着結合の形成速度の低下が認められることから、1-アフアディンは接着結合と密着結合の形成を促進する機能があることが示されていた。しかし、この 1-アフアディンをロックダウンした MDCK 細胞では野性型の MDCK 細胞に比べ、アフアディンの発現量は著明に低下しているが完全に消失はしておらず、1-アフアディンが接着結合と密着結合の形成に必須であるかは不明であった。そこで、本研究では、まずゲノム編集技術の CRISPR/Cas9 法を用い、マウス乳腺上皮細胞株の EpH4 細胞において 1-アフアディンをコードする遺伝子の破壊を行い、アフアディンロックアウト EpH4 細胞を作製した。アフアディンの発現量をウェスタンブロット法で検討したところ、1-アフアディンは、野生型 EpH4 細胞では検出されたのに対して、アフアディンロックアウト EpH4 細胞では全く検出されなかった。一方、アフアディンロックアウト EpH4 細胞における、ネクチン-1 や E-カドヘリン、 α E-カテニン、クローディン 3、および ZO-1 の発現量は、野生型 EpH4 細胞におけるそれぞれのタンパク質の発現量と同程度であった。さらに、1-アフアディンの発現と局在を蛍光免疫染色法で検討したところ、1-アフアディンは野生型 EpH4 細胞では隣り合う細胞間に集積していたが、アフアディンロックアウト EpH4 細胞では全く集積していなかった。これらの結果から、アフアディンロックアウト EpH4 細胞ではアフアディンが完全に消失していることが確認された。

II. 接着結合と密着結合の形成促進における 1-アフアディンの必要性

そこで、このアフアディンロックアウト EpH4 細胞と野生型 EpH4 細胞を用いて、接着結合と密着結合の形成における 1-アフアディンの役割を、細胞間接着構造形成に関する評価系であるカルシウムスイッチアッセイ法で再検討した。Eph4 細胞を通常カルシウム濃度 (2 mM) で培養すると、ネクチン-1 や E-カドヘリン、 α E-カテニン、クローディン-3 および ZO-1 は、アフアディンロックアウト EpH4 細胞と野生型 EpH4 細胞の隣り合う細胞間で同程度に集積していたが、エチレンジアミン四酢酸 (EDTA) を用いて培地中におけるカルシウムをキレートして培養すると、両者の細胞は丸くなって、これらのタンパク質は隣り合う細胞間に集積していなかった。アフアディンロックアウト EpH4 細胞と野生型 EpH4 細胞を再び通常カルシウム濃度 (2 mM) で培養すると、これらすべてのタンパク質は時間経過と共に隣り合う細胞間に再集積した。しかし、アフアディンロックアウト EpH4 細胞では、野生型 EpH4 細胞に比べ、隣り合う細胞間におけるこれらのタンパク質の再集積の速度は低下していた。これらの結果から、1-アフアディンが完全に消失した EpH4 細胞においても、1-アフアディンをロックダウンした MDCK 細胞を用いた以前の実験結果と同様に、1-アフアディンは接着結合と密着結合の形成を促進することが明らかになった。

III. 接着結合と密着結合の形成促進における 1-アフアディンのアクチン結合活性の必要性

次に、接着結合と密着結合の形成促進における 1-アフアディンのアクチン結合活性の必要性について検討した。そのために、まずアフアディンロックアウト EpH4 細胞に 1-アフアデ

イン、アクチン結合ドメインと3番目のプロリンリッチ領域を欠失している s-アフアディン、あるいはアクチン結合ドメインのみを欠失している l-アフアディンの変異体を再発現させた細胞株を作製し、これらの細胞株を用いて同様のカルシウムスイッチアッセイを行った。その結果、l-アフアディンを再発現させた細胞株と野生型 EpH4 細胞では、ネクチン-1 や E-カドヘリン、 α E-カテニン、クローディン-3 および ZO-1 は隣り合う細胞間に同程度に集積した。しかし、s-アフアディンあるいはアクチン結合ドメインを欠失した l-アフアディンを再発現させた細胞株では、アフアディンノックアウト EpH4 細胞と同様に、隣り合う細胞間におけるこれらのタンパク質の再集積の速度は低下していた。これらの結果から、接着結合や密着結合の形成の促進には l-アフアディンのアクチン結合活性が必要であることが明らかになった。

[考察]

上皮細胞が細胞間接着装置を形成する際、隣り合う細胞間でのネクチン同士の結合は細胞内シグナル伝達分子の Src、Rap 1、Rac および Cdc42などを活性化し、アクチン細胞骨格の再編成を引き起こす。一方、細胞間接着装置の形成はアクチン細胞骨格を破壊する分子によって阻害される。l-アフアディンはネクチンの細胞質領域に結合すると共に、E-カドヘリンの細胞質領域に β -カテニンを介して結合している α E-カテニンとも結合し、ネクチンによって形成された接着部位に E-カドヘリンをリクルートして接着結合を形成する。さらに、l-アフアディンは ZO-1 と結合してクローディンやオクルーディンおよび JAM-1 を接着結合の頭頂側にリクルートして密着結合を形成する。これらの l-アフアディンと α E-カテニンおよび ZO-1 はすべてアクチン結合タンパク質である。本研究から、l-アフアディンは接着結合と密着結合の形成を促進する機能があり、その機能には l-アフアディンのアクチン結合活性が必要であることが明らかになった。この本研究の結果とこれまでの知見から、l-アフアディンのアクチン結合活性の少なくとも一つの役割は、l-アフアディンと α E-カテニンおよび ZO-1 との結合を制御することによって接着結合と密着結合の形成を促進することであると考えられる。しかし、l-アフアディンのアクチン結合活性が l-アフアディンとこれらのタンパク質との結合をどのように制御するかは今後さらに解析する必要がある。