



Sunitinib decreases the expression of KRT6A and SERPINB1 in 3D human epidermal models

Yoshida, Ayaka

(Degree)

博士（医学）

(Date of Degree)

2021-03-25

(Resource Type)

doctoral thesis

(Report Number)

甲第8041号

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/D1008041>

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。



(課程博士関係)

学位論文の内容要旨

Sunitinib decreases the expression of KRT6A and SERPINB1 in 3D human epidermal models

スニチニブはヒト表皮3次元モデルにおいて KRT6A および SERPINB1 の発現を減少させる

神戸大学大学院医学研究科医科学専攻
病理診断学

(指導教員：伊藤 智雄教授)

吉田 彩夏

【背景・目的】

血管新生阻害作用を有するマルチキナーゼ阻害薬は、近年のがん化学療法において重要な薬剤の一つであるが、手足皮膚反応をはじめとした特徴的な副作用をもたらすことが知られている。手足皮膚反応は、手掌部や足底部の過角化を主たる病理像とし、疼痛による歩行・把持困難などの機能障害を引き起こすことで患者の生活の質（QOL）を著しく低下させる。しかし、手足皮膚反応の発症はマルチキナーゼ阻害薬治療の有効性と関連するため、手足皮膚反応の効果的な予防・治療法の確立が患者の QOL のみならず治療の予後を改善するために重要である。

腎細胞がん治療の第一選択薬であるスニチニブは、血管内皮増殖因子受容体（VEGFR）1-3 型、血小板由来増殖因子受容体（PDGFR） α および β , c-Kit, FMS 様チロシンキナーゼ-3, コロニー刺激因子-1 受容体を標的としたマルチキナーゼ阻害薬である。スニチニブによる手足皮膚反応の発症頻度は、保湿効果を有するヘパリン類似物質または尿素含有軟膏による適切な予防を行った場合においても約 30% と高頻度である。重度の手足皮膚反応の治療には経験的にステロイド含有軟膏が使用されているが、十分な根拠はない。

本研究では、手足皮膚反応の有効な予防・治療法の開発を目指して、病態の分子機構の解明を行うため、ヒト角化細胞モデルを用いて、スニチニブがもたらす皮膚科学的・分子生物学的変化に伴い発現変動を認める角化因子の探索を行った。

【方法】

ヒト表皮 3 次元モデルには EPI-200 を用いた。真皮層側からスニチニブを処置した EPI-200 を用いて、マイクロアレイによる網羅的な遺伝子発現解析を行った。さらに、同様の処置を行った EPI-200 を用いて免疫組織染色を行い、遺伝子発現変動が認められたタンパク質を確認した。

単層培養の細胞株を用いた検討には、ヒト正常表皮角化細胞（NHEK 細胞）およびヒト不死化正常表皮角化細胞（PSVK1 細胞）を用いた。NHEK 細胞および PSVK1 細胞におけるスニチニブおよび各種阻害剤処置後のタンパク質発現変動は western blot 法により評価した。また、PSVK1 細胞におけるスニチニブおよび glycogen synthase kinase (GSK)-3 β 阻害剤処置後の β -catenin の核内移行は免疫蛍光染色法により評価した。

【結果・考察】

1 μ M スニチニブを 5 日間処置したヒト表皮 3 次元モデルを用いてマイクロアレイ解析を行い、対照と比較して 1.5 倍以上の発現量の増加または減少を示す 173 遺伝子を抽出した。その中から Gene Ontology Biological Process Term を用いた分子機能に基づく選択と角化異常に関する文献的選択プロセスにより serine protease inhibitor (SERPIN) B1, keratin (KRT) 6A, KRT5, SERPIN Kazal-type (SPINK) 6 をスニチニブによる角化異常に関与する候補因子として選択した。免疫組織染色により、スニチニブを処置したモデルでは、手足皮膚反応と類似する病理学的形態変化とともに KRT6A および SERPINB1 の染色面積比が対照と比較して有意に減少することを確認した。一方、KRT5 は染色面積比に有意な差を認めず、SPINK6 は本研究で用いた EPI-200 において検出されなかった。以上より、スニチニブはヒト表皮 3 次元モデルにおいて SERPINB1 および KRT6A の発現を減少させることが示された。

SERPINB1 および KRT6A は手足皮膚反応と病理像が類似した長島型掌蹠角化症および Jadassohn-Lewandowsky 型先天性爪甲厚硬症のそれぞれの原因遺伝子であることが報告されている。特に、基底層および基底上層に局在する KRT6A は、角化細胞の正常な増殖、細胞接着、遊走ならびに角化細胞の炎症を促進し、表皮の損傷を回復させるために重要な役割を果たしていることが知られている。従って、本研究で観察された SERPINB1 および KRT6A の減少は、表皮の生物学的・病理学的変化を引き起こす可能性が高いと考える。

次に、単層培養の細胞株を用いて、スニチニブによる角化関連因子の発現変動を評価した。その結果、1 μ M スニチニブを 48 時間処置した NHEK 細胞においては、KRT6A, SERPINB1, KRT5 および SPINK6 の発現に有意な変化を認めなかったが、PSVK1 細胞においては KRT6A の発現が有意に減少した。スニチニブを処置した PSVK1 細胞では、KRT6A の発現減少と同時に extracellular signal-regulated kinases (ERK)1/2 および p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) のリン酸化レベルの低下を認めた。また、スニチニブの有無にかかわらず、MAPK/ERK 阻害剤である U0126 ならびに p38 MAPK 阻害剤である SB203580 を処置した PSVK1 細胞においても KRT6A の発現が有意に減少した。さらに、 β -catenin の核内移行を介して成長・増殖因子とは異なる経路から ERK1/2 のリン酸化を亢進させる GSK-3 β 阻害剤である SB216763 をスニチニブと併用すること

で、スニチニブによる ERK1/2 および p38 MAPK リン酸化レベルの低下ならびに KRT6A の発現減少は有意に抑制された。

スニチニブは VEGFR および PDGFR のチロシンキナーゼを阻害することが主な作用機序である。そして、ERK1/2 および p38 MAPK は、ともに成長・増殖因子受容体の下流にあるシグナル伝達物質であるため、スニチニブの長期的な曝露は、ERK1/2 および p38MAPK のリン酸化を抑制する。ERK1/2 などの MAPK は KRT6A の発現を制御していることが知られており、KRT6A の発現減少が MAPK/ERK および p38 MAPK の選択的阻害剤によっても認められたことから、スニチニブによる KRT6A の発現減少は、ERK や p38 MAPK 経路を介したスニチニブの作用機序に基づく現象である可能性が高い。

【結論】

スニチニブはヒト表皮 3 次元モデルにおける KRT6A および SERPINB1 の発現を減少させることが明らかとなった。さらに、KRT6A の発現変動は ERK1/2 および p38 MAPK シグナル伝達経路を介することが示唆された。KRT6A および SERPINB1 の発現変動が、スニチニブに起因する手足皮膚反応の病態に寄与している可能性があるため、これら因子の発現変動を抑制することが、効果的な手足皮膚反応の予防・治療法の開発戦略となり得る。